




CALENDARIO de VACINACIÓN de ADULTOS

2017

(a partir do 3 de xullo)

	Ata 35 anos	36-49 anos	50-59 anos	60 ou máis anos
Td (tétano e difteria)	Completar ou iniciar pauta de vacinación (5 doses) Se ten calendario infantil completo: 1 dose de recordo ao redor dos 65 anos			
dTpa⁽²⁾	Embarazadas (semana 28-36, preferiblemente 32): 1 dose en cada embarazo			
Gripe	Se existe factor de risco: 1 dose anual			1 dose anual
Pneumocócica conxugada 13 v	Se existe factor de risco: 1 dose			1 dose ao cumprir 65 anos
Pneumocócica polisacáridos 23 v	Se existe factor de risco: 1 dose (intervalo mínimo 1 ano despois de Pn13)			1 dose aos 66 anos ⁽¹⁾
Hepatite B	Se non foron vacunados previamente: 3 doses	Nados antes de 1982, se existe factor de risco: 3 doses		
Triple vírica⁽³⁾ (sarampelo, rubéola e parotidite)	Se non foron vacunados previamente e naceron despois de 1981: 2 doses Se non cumpren criterios de inmunidade e naceron entre 1968 e 1981: 1 dose			
Varicela⁽⁴⁾	Vacinação se non cumpren criterios de inmunidade: 2 doses			
Meningococo C	Se non foron vacunados previamente: 1 dose	Se existe factor de risco: 1 dose		
Virus do papiloma humano (VPH) mulleres	Non vacunadas previamente, nadas a partir 1994: 3 doses	Se existe factor de risco: 3 doses ⁽⁵⁾		

 Para todas as persoas desta categoría e das idades indicadas para as que non haxa constancia de inmunización/inmunidade
 Recomendada se existe outro factor de risco
 Non indicada

(1) **Pneumocócica de polisacáridos 23 v:** Persoas de 66 anos ou maiores desta idade non vacunadas con anterioridade

(2) **dTpa:** Persoal sanitario das áreas de obstetricia e pediatria: 1 dose

(3) **Triple vírica:** 2 doses para sanitarios, traballadores de centros educativos e viaxeiros a zonas de alto risco

(4) **Varicela:** segundo as fichas técnicas das vacinas fronte á varicela non existen datos de eficacia protectora nin de resposta inmune nas persoas seronegativas > 65 anos

(5) **VPH:** Mulleres sometidas a tratamento excisional de CIN2+ ou AIS nos 6 últimos meses: 3 doses



CALENDARIO de VACUNACIÓN de ADULTOS

2017

		Hasta 35 años	36-49 años	50-59 años	60 o más años
VACUNAS	Td (tétanos y difteria)	Completar o iniciar pauta de vacunación (5 dosis) Si tiene calendario infantil completo: 1 dosis de recuerdo alrededor de los 65 años			
	dTpa ⁽²⁾	Embarazadas (semana 28-36, preferiblemente 32): 1 dosis en cada embarazo			
	Gripe	Si existe factor de riesgo: 1 dosis anual			1 dosis anual
	Pneumocócica conjugada 13 v	Si existe factor de riesgo: 1 dosis			1 dosis al cumplir 65 años
	Pneumocócica polisacáridos 23 v	Si existe factor de riesgo: 1 dosis (intervalo mínimo 1 año después de PnC13)			1 dosis a los 66 años ⁽¹⁾
	Hepatitis B	Si no están vacunados previamente: 3 dosis	Nacidos antes de 1982, si existe factor de riesgo: 3 dosis		
	Triple vírica ⁽³⁾ (sarampión, rubéola y parotiditis)	Si no están vacunados previamente y nacieron después de 1981: 2 dosis Si no cumplen criterios de inmunidad y nacieron entre 1968 y 1981: 1 dosis			
	Varicela ⁽⁴⁾	Vacunación si no cumplen criterios de inmunidad: 2 dosis			
	Meningococo C	Si no están vacunados previamente: 1 dosis	Si existe factor de riesgo: 1 dosis		
	Virus del papiloma humano (VPH) mujeres	No vacunadas previamente, nacidas a partir 1994: 3 dosis	Si existe factor de riesgo: 3 dosis ⁽⁵⁾		

■ Para todas las personas de esta categoría y de las edades indicadas para las que no haya constancia de inmunización/inmunidad
 ■ Recomendada si existe otro factor de riesgo
 ■ No indicada

(1) **Pneumocócica de polisacáridos 23 v:** Personas de 66 años o mayores de esta edad no vacunadas con anterioridad

(2) **dTpa:** Personal sanitario de las áreas de obstetricia y pediatría: 1 dosis

(3) **Triple vírica:** 2 dosis para sanitarios, trabajadores de centros educativos y viajeros a zonas de alto riesgo

(4) **Varicela:** según las fichas técnicas de las vacunas frente a la varicela no existen datos de eficacia protectora ni de respuesta inmune en las personas seronegativas > 65 años

(5) **VPH:** Mujeres sometidas a tratamiento excisional de CIN2+ o AIS en los 6 últimos meses: 3 dosis

